ANISOPTERA

(Großlibellen)

- umfassen in D 52 Arten
- in 5 Familien und 17 Gattungen

Verteilung der Arten

- Aeshnidae (14)
- Cordulegasteridae (2)
- Corduliidae (7)
- Gomphidae (7)
- Libellulidae (22)

Symbole : Larvenhabitate

und

Habitatansprüche der Imagines

Seen, Teiche,
Weiher

Fluss

Bach, Quelle

Moor

Freiwasser

Untergetauchte Pflanzen

Schwimblattvegetation

Röhricht, Binsen,
Ufervegetation

Torfmoose

Bäume, Sträucher

sp.= Art
spp.= Arten
Habitat= Lebensraum

Aeshnidae

Allgemein

- dt. Bezeichnung: Edellibellen
- gehören zu den größten Vertreter der Anisopteren
- 14 Arten in D
- 4 Gattungen: *Anax* (3), *Aeshna* (9), *Brachytron* (1), *Boyeria* (1)

Erkennungsmerkmale

- oft mit „mosaikartig“, gefärbtem Abdomen in unterschiedlichen, kontrastreichen Farben
z.B. Herbst-Mosaikjungfer (*Aeshna mixta*) A1
Ausnahmen: Braune Mosaikjungfer (*Aeshna grandis*) A3,
Keilfleckmosaikjungfer (*Aeshna isoceles*) A4
und Kleine Königslibelle (*Anax parthenope*) A5
sie gelten als „Die fliegenden Edelsteine der Natur“
- Komplexaugen in unterschiedlichen Farben, welche einen Großteil des Kopfes ausmachen, berühren sich auf einer längeren Strecke
- Ausgeprägter Geschlechtsdimorphismus
Ausnahme: Keilfleck-Mosaikjungfer (*Aeshna isoceles*)
- Flügel mit höchstens leichter gefärbter Äderung z.B. Große Königslibelle (*Anax imperator*) A2 und Braune Mosaikjungfer (*Aeshna grandis*)
- sie sind geschickte, wendige, besonders ausdauernde, rasante und mit bis zu 50 km/h schnelle Fluginsekten

Eiablage

- in waagrecht oder senkrecht Pflanzenmaterial
A6 Kleine Mosaikjungfer oder Früher Schilfjäger
(*Brachytron pratense*)
- sitzend allein, wobei das Männchen sein Weibchen
manchmal auch bewacht
Ausnahme: Kleine Königslibelle (*Anax parthenope*),
mit angekoppelten Männchen (Tandem)

Larven

- zigarrenförmig und kräftig mit flacher Fangmaske
und großen Augen
Ausnahme: Kleine Mosaikjungfer
(*Brachytron pratense*) mit Knopfaugen
- mit einer Länge von bis zu 5,7 cm stellt die Larve
der Großen Königslibelle (*Anax imperator*) A8
die Größte der heimischen Libellenfauna dar

Besonderheiten

- Libelle des Jahres 2012 – Blaugrüne Mosaikjungfer
(*Aeshna cyanea*) Bild A7

Larvenhabitate

Habitatansprüche der Imagines

Cordulegasteridae

Allgemein

- dt. Bezeichnung: Quelljungfern
- griechisch: *kordylê* - Keule und *gastêr* – Bauch
- größte heimische Libelle mit einer Flügelspannweite von bis zu 11 cm und 8,5 cm Körperlänge (Bellmann und Dreyer)*
- 2 Arten in D
- eine Gattung: *Cordulegaster*

Erkennungsmerkmale

- grünliche Augen berühren sich nur in einem Punkt
- Cg1 Zweigestreiften Quelljungfer beim Schlupf (*Cordulegaster boltonii*)
- mit schwarz-gelb gestreiften Thorax und Abdomen
- kein Geschlechtsdimorphismus

Eiablage

- in das Kiesbett kleiner strömender Gewässer
- im Flug ohne Begleitung des Männchens

Larven

- Larvenstadium bis zu 7 Jahren
- mit stark unregelmäßig gezackter Fangmaske, dieses Merkmal ist der Familie eigen
- Cg3 Porträt von einer C. b. Exuvie

Larvenhabitat

Habitatansprüche der Imagines

*In der Literatur variieren die Angaben und als größte heimische Libelle wird auch die Große Königslibelle (*Anax imperator*) angegeben. Das ist auch der Tatsache geschuldet, da sie in ihrem Bestand nicht gefährdet ist und aus diesem Grund mehr Untersuchungsergebnisse vorliegen. Da es sich auch um natürliche Maße handelt und es auch einer gewissen Schwankungen unterliegen, kann man in etwa sagen das sie sich, was die Größe und Gewicht angeht, ähneln.

Corduliidae

Allgemein

- dt. Bezeichnung: Falkenlibellen
- griechisch: kordyleia - die Keulige
- 7 Arten in D
- 4 Gattungen: *Cordulia* (1), *Epitheca* (1), *Oxygastra* (1), *Somatochlora* (4)

Erkennungsmerkmale

- metallisch grün, bronze bis kupfern glänzender gesamter Körper z.B. C1 Glänzende Smaragdlibelle (*Somatochlora metallica* ♂) Ausnahme: Zweifleck (*Epitheca bimaculata* ♀) C2
- grünliche (oder bräunliche) Augen, mit ausgeprägten Interferenz - Effekten, sind auf kurzer Strecke miteinander verbunden und mit Ausbuchtung des Hinterrandes versehen
- Flügel ohne Markierungen, Ausnahme: C2
- Weibchen in manchen Fällen mit senkrechter auffällig, abstehender Legeröhre
- der Zweifleck ist die breiteste Larve in D und ein wahrer „Minidrachen“ C3

Eiablage

- in die Uferbereiche mit schlagenden oder wippenden Bewegungen
- im Flug ohne Begleitung des Männchens

Larven

- mit auffallend langen Beinen, die weit über das Abdomenende ragen und mit unterschiedlich ausgeprägten Dorsal- und Lateraldornen

Larvenhabitat

Habitatansprüche der Imagines

Gomphidae

Allgemein

- dt. Bezeichnung: Flussjungfern
- griechisch: *gomphos* - Pflöck, Keil
- 7 Arten in D
- 3 Gattungen: *Gomphus* (4), *Ophiogomphus* (1), *Onychogomphus* (2)

Erkennungsmerkmale

- grünliche Augen mit deutlichem Abstand
G1 Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia* ♀)
und G2 Gemeine Keiljungfer (*Gomphus vulgatissimus* ♂)
- kontrastreich gezeichnet in schwarz, gelb und grün und das über den gesamten Körper (Kopf, Brust und Hinterleib)
- Geschlechter ähnlich, Männchen oft mit verbreiterten hinteren Abdominalsegmenten und „Zange“ oder Kralle
G3 Kleine Zangenlibelle (*Onychogomphus forcipatus* ♂)

Eiablage

- erfolgt in das Freiwasser
- allein mit wippender Bewegung

Larven

- mit kurzen, verbreiterten nur 4 gliedrigen Antennen und kräftigen Beinen mit Grabsporen, G4 Exuvie von G2
- gedrungene Gestalt und stark behaart, Hinterleib mit starker Verjüngung

Larvenhabitat

Habitatansprüche der Imagines

Libellulidae

Allgemein

- dt. Bezeichnungen: Segellibellen
- lateinisch: von Libra - Waage
- Größe sehr variabel
- mit 22 Arten in D die artenreichste Familie
- 5 Gattungen: *Libellula* (3), *Crocothemis* (1), *Leucorrhinia* (5), *Orthetrum* (4) und *Sympetrum* (9)

Erkennungsmerkmale

- sind typische Ansitzjäger und fliegen oft an exponierte Stellen (Halme, abgestorbene Äste), auch häufig auf kahlen Flächen (Wege, Stämme) anzutreffen
- bei hohen (oder niedrigen) Temperaturen nehmen sie die „Obeliskhaltung“ ein, je nach Sonnenstand
- beim Ansitz werden die Flügelspitzen weit über das Kopfende nach vorn gezogen, L5 Großer Blaupfeil (*Orthetrum cancellatum* ♂)
- Färbung sehr variabel, L1- L9
- Augen unterschiedlich gefärbt ohne Ausbuchtung des Hinterrandes, Achtung ! Unterscheidungsmerkmal zu den Falkenlibellen (Corduliidae)
- ausgeprägter Geschlechtsdimorphismus, Ausnahme: z.B. Vierfleck (*Libellula quadrimaculata*) L2
- manche Arten mit Basalflecken (*Libellula* spp. u. a.) oder mit teilweise getönten Flügeln, z. B. Gebänderte Heidelibelle (*Sympetrum pedemontanum*) u.a.
- Hinterflügel sehr breit und flächig ausgebildet
- Abdomen variabel (verdickt, abgeplattet oder zylindrisch)

Eiablage

- in das Freiwasser, auch auf Pflanzenteile (z.B. Torfmoos) oder in feuchte Uferbereiche im Flug
- mit angekoppelten Männchen z.B. Heidelibellen, L6 *Sympetrum striolatum* (Tandemflug) oder allein *Libellula* spp. und *Leucorrhinia* spp.

Larven

- mit gewölbter Fangmaske und breiten oder sich verschmälerndem Kopf L 10 Exuvie von der Gemeinen Heidelibelle (*Sympetrum vulgatum*)
- die Schwarze Heidelibelle (*Sympetrum danae*) ist mit 1,3 cm Körperlänge die kleinste Larve unter den Großen

Besonderheiten

- moorangepasste Arten, darunter die „kleinste“ Anisoptera mit nur etwa 3 cm Körperlänge: Zierliche Moosjungfer (*Leucorrhinia caudalis*) L8
- die „breiteste“ Libelle, der Plattbauch (*Libellula depressa*) L9 ♂ und L9 ♀
- die „farbintensivste“ und zugleich Libelle des Jahres 2011 – die Feuerlibelle (*Crocothemis erythraea*) L7

Larvenhabitat

Habitatansprüche der Imagines

Literatur:

Der Kosmos Libellenführer

Der Kosmos Libellenführer

Die Libellen

Die Libellen Baden-Württembergs Band 1&2

Field Guide to the Dragonflies of Britain & Europe

Juwelenschwingen / Gossamer Wings:

Geheimnisvolle Libellen /Mysterious Dragonflies

Die Libellenlarven Deutschlands

Heiko Bellmann

Gerhard Jurzitza

Wolfgang Dreyer

Klaus Sternberg und Rainer Buchwald

Klaas-Douwe B Dijkstra und Richard Lewington

Dagmar Hilfert- Rüppell und Georg Rüppell

Harald Heidemann und Richard Seidenbusch

Fotos der Imagines und Exuvien:

Ph. Meyer

H-W. Wunsch www.waldschrat-online.de

D. Sylvester

M. Borkowski

Texte und Piktogramme:

M. Borkowski

Besonderer Dank gilt Heinz-Willi Wunsch, ihm schulden wir das Bild des *Epithea bimaculata* (C2) und der dazugehörigen Exuvie (C3).

Die Bilder der *Aeshna grandis* (A3), der *Cordulegaster boltonii* (Cg2), der *Onychogomphus forcipatus* (G3), sowie der *Leucorrhinia* spp. (L1 und L8) und zu guter Letzt des *Libellula depressa* (L9♀) verdanken wir unseren Libellenfreund Ph. Meyer.